

ميوكسيديل® بخاخ

معالجة تساقط الشعر

ميوكسيديل متوفّر بتراكيز (٢٪، ٥٪)

التأثيرات الجانبية :

دوحة أحياناً، حدوث تتشير وحكة للمنطقة المعالجة من فروة الرأس في بعض الحالات، تهيج جلدي.

تحذيرات :

- لا يطبق المستحضر على أي موضع آخر من الجسم.
- ينصح باستشارة الطبيب في حالات الحمل والرضاعة.
- يجب عدم ملامسته للعين وإذا حصل فتنسّل العين جيداً بكمية كبيرة من الماء.
- تجنب وصول محلول للجروح المفتوحة.

التدخلات الدوائية :

- لا يستعمل ميوكسيديل مع أي مستحضرات موضعية أخرى.

الجرعة وطريقة الاستعمال :

- يبخ حوالي ١ مل (ما يعادل ١٢ بخة) مرتين يومياً بشكل مباشر على المنطقة المعالجة من فروة الرأس ويفضل أن يكون الشعر جافاً، ويستخدم المحلول لمدة ٤-٣ أشهر.

الحفظ :

- يحفظ في درجة حرارة بين (١٥ - ٣٠) م°

للاستعمال الخارجي فقط

التعبئة :

- عبوة ميوكسيديل ٥ تحتوي على ٦٠ مل.
- عبوة ميوكسيديل ٢ تحتوي على ٦٠ مل.

التركيب :

كل ١٠٠ مل من ميوكسيديل ٢ تحتوي على:
ميوكسيديل ٢ غ

سواغ مناسب كافية لأجل ١٠٠ مل
كل ١٠٠ مل من ميوكسيديل ٥ تحتوي على:
ميوكسيديل ٥ غ

سواغ مناسب كافية لأجل ١٠٠ مل

الزمرة الدوائية وخواص المستحضر :

ينتمي الميوكسيديل لزمرة الأدوية الجلدية حيث يعتبر من المسعات الوعائية المحيطية، يطبق موضعياً في معالجة الصلع وتساقط الشعر.

الاستطبابات :

ميوكسيديل محلول موضعى معالجة الصلع وتساقط الشعر.

حركة الدواء :

بعد التطبيق الموضعى للميوكسيديل يتمتص عن طريق الجلد بنسبة تتراوح بين ٣٪ إلى ٤٥٪ من الجرعة الكلية المستخدمة.
يسقط الميوكسيديل في الكبد وتطرح مستقلباته مع البول.
لا يعبر الميوكسيديل الحاجز الدموي الدماغي.

مضادات الاستطباب :

ميوكسيديل بخاخ لا يستخدم في حالة احمرار فروة الرأس، أو وجود جروح أو حرق أو تهيج في فروة الرأس.

ينصح باستشارة الطبيب في حالات هبوط الصبغ.

١- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر
٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال



إنتاج فريسيما فارما
المملكة - صنعاء
www.freesiapharma.com

Mioxidil® Spray

Hair regrowth treatment

Mioxidil available as (2% , 5%)

Composition :

Each 100 ml of Mioxidil 2 contains :

Minoxidil USP 2 g
Excipient Q.S.F. 100 ml

Each 100 ml of Mioxidil 5 contains :

Minoxidil USP 5 g
Excipient Q.S.F. 100 ml

Medical group and Product Properties :

Minoxidil belongs to dermatological group, which acts as peripheral vasodilator, it used topically for alopecia and hair loss treatment.

Indications:

Mioxidil is used for the treatment of alopecia, and for the treatment of hair loss.

Pharmacokinetics:

Following topical application Minoxidil is absorbed from the skin with an average of (0.3% – 4.5 %) of the total applied dose. Minoxidil is metabolized in the liver and its metabolites are excreted with urine . Minoxidil does not cross the blood brain barrier .

Contraindication :

- Mioxidil is not used when there is redness, injuries, irritation or burns in the scalp .

1- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you .
2- Keep out of reach of children.

- Consult your doctor in case of hypotension .

Side effects :

Sometimes dizziness, In some cases it may cause itching , peeling and other skin irritations.

Precaution :

- Mioxidil is not applied to any other area of the body.
- Consult your doctor in case of pregnancy and lactation .
- Avoid contact with eyes, if rinse with large amount of water.
- Avoid contact with injured skin.

Medical interaction :

Mioxidil should not be used with other topical products.

Dosage and directions of use :

Apply 1 ml (around 12 spray times) twice a day directly on the scalp where is the hair loss area, it is preferred to be applied on dry hair and used for 3-4 months.

Storage :

Store between (15- 30) C° .

For external use only .

Packaging :

- Mioxidil Bottle 5 contains 60 ml .
- Mioxidil Bottle 2 contains 60 ml .



Produced by Freesia Pharma
Yemen - Sana'a
www.freesiapharma.com